

MIOPROPAN LP

TRIMEBUTINA 300 mg

COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA

Composición:

Cada comprimido de liberación prolongada contiene:

Trimebutina maleato	300 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa	98,10 mg
Povidona	40 mg
Estearato de magnesio	30 mg
Lactosa anhidra c.s.p.	600 mg

Acción terapéutica:

Antiespasmódico. Modulador de la motilidad digestiva.

Indicaciones:

Síndrome de colon irritable.

Recuperación de la función intestinal en post-operatorios (ileo post-operatorio). Constipación.

Dolor abdominal por trastornos funcionales intestinales. Dispepsia no ulcerosa.

Procedimientos radiológicos: disminuye los dolores luego del procedimiento con sustancias radioopacas.

Acción farmacológica:

Su acción es mediada por dos mecanismos: como agonista de los receptores opioideos del músculo liso de las paredes del tracto intestinal y por la liberación de péptidos gastrointestinales como la motilina y bajo ciertas condiciones afecta el aumento postprandial de gastrina, glucagon, polipéptidos pancreáticos, etc. También actúa sobre los receptores opioideos del plexo mientérico en una doble acción excitatoria-inhibitoria sobre las neuronas post-sinápticas del ganglio mesentérico inferior. Por estos mecanismos aumenta la motilidad gástrica e intestinal favoreciendo el tránsito del contenido intestinal y reduce el dolor visceral producido por la distensión colorrectal.

Farmacocinética:

Luego de su administración oral la absorción de trimebutina es casi completa. El 94% de la dosis se elimina por riñón como varios metabolitos. El pico máximo de concentración plasmática se observa 1 hora después de su administración. La vida media es de 1 hora aproximadamente. El principal metabolito de trimebutina, la nortrimebutina se forma en el hígado y ejerce su acción principalmente en el colon, además en el resto del tracto digestivo. En la forma de liberación prolongada trimebutina se libera alrededor del 80% en 8 horas en medio ácido.

Posología - Modo de administración:

1 comprimido por día preferentemente antes de las comidas. En caso de ser necesario puede incrementarse a 2 comprimidos por día.

Contraindicaciones:

Miastenia gravis. Hipersensibilidad a la trimebutina o a cualquier componente de la fórmula. Embarazo: contraindicado en el 1er. trimestre.

Advertencias:

La respuesta al tratamiento con trimebutina no excluye descartar otras enfermedades del aparato digestivo.

Interacciones medicamentosas:

No se describen interacciones, no obstante, se aconseja alejar las tomas de antiácidos por lo menos 3 horas de la ingesta de **MIOPROPAN LP**.

Interacción e influencia sobre las pruebas de laboratorio:

No se han descripto.

Carcinogénesis - Mutagénesis - Trastornos de la fertilidad:

No se han descripto.

Embarazo - Efectos teratogénicos:

Aunque no se han descripto efectos teratogénicos en animales se recomienda evitar su uso en el primer trimestre del embarazo.

Lactancia: su uso no se recomienda durante este período.

Reacciones adversas:

Piel: rara vez reacciones alérgicas, sensaciones de frío-calor.

SNC: ocasionalmente decaimiento, mareos o somnolencia.

Sobredosificación:

En caso de sobredosis accidental puede presentarse somnolencia, lipotimia, diarrea y náuseas. El tratamiento será sintomático y orientativamente, si no ha transcurrido 1 hora de la ingesta se puede inducir al vómito o realizar lavado gástrico.

“Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría: Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777”

“Mantener fuera del alcance de los niños”.

Conservación:

Conservar en lugar seco a una temperatura entre 15° y 30° C

Presentación:

MIOPROPAN LP: Envases con 20, 30 y 60 comprimidos de liberación prolongada.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 35.121

Director Técnico:

Vicente López González. Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 28/12/00



Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Teléfonos: 4501-3278/79,

www.laboratoriosbernabo.com