



# QURA GRIP

PARACETAMOL  
BUTETAMATO  
CAFEINA  
FENILEFRINA

Comprimidos Recubiertos

**Analgésico - Antifebril - Descongestivo - Antitusivo**

**Composición:**

**Cada comprimido recubierto de QURA GRIP contiene:**

Paracetamol	500 mg
Butetamato Citrato	40 mg
Cafeína	30 mg
Fenilefrina HCl	8 mg
Copolímero del ácido metacrílico tipo C/ dióxido de silicio coloidal/ trietilcitrato/ talco/ dióxido de titanio/ bicarbonato de sodio	89,81 mg
PVP K30	37,50 mg
Croscarmelosa Sódica	30 mg
Almidón Pregelatinizado	30 mg
Estearato de Magnesio	10,50 mg
Talco	7,50 mg
Dióxido de Silicio Coloidal	4 mg
Laca Aluminica Amarillo Ocaso	0,35 mg
Celulosa Microcristalina c.s.p.	840 mg

**USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN**

**Acción terapéutica:** Es analgésico, antifebril, antitusivo y descongestivo.

**Indicaciones:** QURA GRIP está indicado para el tratamiento sintomático de los estados gripales que cursen con fiebre, dolor muscular, congestión nasal y tos.

**Posología:**

**Cómo usar este medicamento: Dosis habitual:**

Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto cada 6 u 8 horas con abundante líquido. Dosis máxima: 4 comprimidos/día.

**Advertencias:** El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en dosis superiores a las indicadas. No ingiera otro medicamento que contenga paracetamol en forma simultánea con QURA GRIP. Si consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No tomar por más de 5 días si el dolor continúa o más de 3 días para la fiebre. En estos casos consulte a su médico. "Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento". El paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, fundamentalmente de sangre/glucemia.

**Precauciones:** Emplear con precaución en pacientes con hipertensión arterial, enfermedad hepática, hipertiroidismo, afecciones cardíacas, diabetes o enfermedades de la próstata. Se sugiere utilizar con suma precaución en los pacientes que acostumbran tomar bebidas alcohólicas. Usar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto superior como gastritis, úlcera gástrica o sangrado gastrointestinal.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Menores de 12 años. Pacientes en los cuales la aspirina o los AINE (antiinflamatorios) les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. **No administrar** en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, enfermedad renal o alcoholismo.

**Interacciones medicamentosas:** Esta asociación puede disminuir el efecto de medicamentos utilizados para tratar hipertensión y diuréticos. Puede interactuar con antibióticos, cardiotónicos y algunos medicamentos antiparkinsonianos. El uso simultáneo con oxitocina, dihidroergotamina y ergometrina aumenta la acción vasoconstrictora. Potencia los efectos cardiovasculares de algunos antidepresivos. El uso simultáneo aumenta el efecto de las hormonas tiroideas. Si usted está tomando algún medicamento consulte a su médico antes de utilizar QURA GRIP.





**Reacciones adversas:** Rara vez: rash cutáneo, insomnio, mareos, trastornos gastrointestinales, taquicardia, nerviosismo, sedación, sequedad bucal.  
Alteraciones de la sangre: disminución de las plaquetas.

**Sobredosificación:**

*Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:  
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777  
"Todo medicamento debe permanecer fuera del alcance de los niños"*

**Conservación:**

**Conservar en lugar seco, a temperatura inferior de 30°C.**

Seguridad del envase: Verificar que los blisters no presenten roturas.  
Ante cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico

**Presentación:** Envases con 10 comprimidos recubiertos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 56662  
Director Técnico: Vicente López González. Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 28/3/2012



Laboratorios Bernabó

Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, C.A.B.A., Tel.: 4501-3278/79

Elaboración: Terrada 2346, C1416ARZ, C.A.B.A., Tel.: 4501-3278/79 y/o Colectora Ruta Panamericana  
Ramal Pilar Km. 36 N° 3863, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

[www.laboratoriosbernabo.com](http://www.laboratoriosbernabo.com)

S944/40

