

# MIOPROPAN LP

## TRIMEBUTINA 300 mg

### COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA

**Composición:**

Cada comprimido de liberación prolongada contiene:

Trimebutina maleato . . . . .	300 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa . . . . .	98,10 mg
Povidona . . . . .	40 mg
Estearato de magnesio . . . . .	30 mg
Lactosa anhidra c.s.p. . . . .	600 mg

**Acción terapéutica:**

Antiespasmódico. Modulador de la motilidad digestiva.

**Indicaciones:**

Síndrome de colon irritable.

Recuperación de la función intestinal en post-operatorios (íleo post-operatorio). Constipación.

Dolor abdominal por trastornos funcionales intestinales. Dispepsia no ulcerosa.

Procedimientos radiológicos: disminuye los dolores luego del procedimiento con sustancias radioopacas.

**Acción farmacológica:**

Su acción es mediada por dos mecanismos: como agonista de los receptores opioideos del músculo liso de las paredes del tracto intestinal y por la liberación de péptidos gastrointestinales como la motilina y bajo ciertas condiciones afecta el aumento postprandial de gastrina, glucagon, polipéptidos pancreáticos, etc. También actúa sobre los receptores opioideos del plexo mientérico en una doble acción excitatoria-inhibitoria sobre las neuronas post-sinápticas del ganglio mesentérico inferior. Por estos mecanismos aumenta la motilidad gástrica e intestinal favoreciendo el tránsito del contenido intestinal y reduce el dolor visceral producido por la distensión colorrectal.

**Farmacocinética:**

Luego de su administración oral la absorción de trimebutina es casi completa. El 94% de la dosis se elimina por riñón como varios metabolitos. El pico máximo de concentración plasmática se observa 1 hora después de su administración. La vida media es de 1 hora aproximadamente. El principal metabolito de trimebutina, la nortrimebutina se forma en el hígado y ejerce su acción principalmente en el colon, además en el resto del tracto digestivo. En la forma de liberación prolongada trimebutina se libera alrededor del 80% en 8 horas en medio ácido.

**Posología - Modo de administración:**

1 comprimido por día preferentemente antes de las comidas. En caso de ser necesario puede incrementarse a 2 comprimidos por día.

**Contraindicaciones:**

Miastenia gravis. Hipersensibilidad a la trimebutina o a cualquier componente de la fórmula. Embarazo: contraindicado en el 1er. trimestre.

**Advertencias:**

La respuesta al tratamiento con trimebutina no excluye descartar otras enfermedades del aparato digestivo.

**Interacciones medicamentosas:**

No se describen interacciones, no obstante, se aconseja alejar las tomas de antiácidos por lo menos 3 horas de la ingesta de **MIOPROPAN LP**.

**Interacción e influencia sobre las pruebas de laboratorio:**

No se han descripto.

**Carcinogénesis - Mutagénesis - Trastornos de la fertilidad:**

No se han descripto.

**Embarazo - Efectos teratogénicos:**

Aunque no se han descripto efectos teratogénicos en animales se recomienda evitar su uso en el primer trimestre del embarazo.

**Lactancia:** su uso no se recomienda durante este período.

**Reacciones adversas:**

*Piel:* rara vez reacciones alérgicas, sensaciones de frío-calor.

*SNC:* ocasionalmente decaimiento, mareos o somnolencia.

**Sobredosificación:**

En caso de sobredosis accidental puede presentarse somnolencia, lipotimia, diarrea y náuseas. El tratamiento será sintomático y orientativamente, si no ha transcurrido 1 hora de la ingesta se puede inducir al vómito o realizar lavado gástrico.

*“Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:*

*Hospital de Pediatría: Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.*

*Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777”*

*“Mantener fuera del alcance de los niños”.*

**Conservación:**

Conservar en lugar seco a una temperatura entre 15°C y 30°C

**Presentación:**

**MIOPROPAN LP:** Envases con 20, 30 y 60 comprimidos de liberación prolongada. Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 35.121

**Director Técnico:**

Gastón L. Landsman, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 28/12/00



Laboratorios Bernabó S.A.  
Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Teléfonos: (011) 4501-3278/79  
[www.laboratoriosbernabo.com](http://www.laboratoriosbernabo.com)

