

QURA GRIP

PARACETAMOL - BUTETAMATO CAFEÍNA - FENILEFRINA



Comprimidos recubiertos / Vía oral
Analgésico - Antifebril - Descongestivo - Antitussivo

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol (como Paracetamol DC 90%)	500 mg
Butetamato citrato	40 mg
Cafeína	30 mg
Fenilefrina HCl	8 mg
Croscarmelosa sódica	25 mg
Estearato de magnesio	8,4 mg
Opadry II White 85F28751	10 mg
Simeticona emulsionada	0,100 mg
Laca aluminica amarillo ocaso	0,350 mg
Celulosa microcristalina c.s.p.	850 mg

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

Acción terapéutica

Analgésico, antifebril, antitussivo y descongestivo.

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento sintomático de los estados gripales que cursen con fiebre, dolor muscular, congestión nasal y tos.

Posología

Cómo usar este medicamento: Dosis habitual:

Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto cada 6 u 8 horas con abundante líquido.

Dosis máxima: 4 comprimidos/día.

Advertencias

El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en dosis superiores a las indicadas. No ingiera otro medicamento que contenga paracetamol en forma simultánea con **QURA GRIP**.

Si consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No tomar por más de 5 días si el dolor continúa o más de 3 días para la fiebre.

En estos casos consulte a su médico.

“Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento”

El paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, fundamentalmente de sangre/glucemia.

Precauciones

Emplear con precaución en pacientes con hipertensión arterial, enfermedad hepática, hipertiroidismo, afecciones cardíacas, diabetes o enfermedades de la próstata. Se sugiere utilizar con suma precaución en los pacientes que acostumbran tomar bebidas alcohólicas.

Usar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto superior como gastritis, úlcera gástrica o sangrado gastrointestinal.

Advertencias especiales y precauciones de uso

Se han notificado casos de acidosis metabólica con anión gap aumentado debida a acidosis piroglutámica en pacientes con enfermedad grave como la insuficiencia renal grave y la sepsis, o en pacientes con malnutrición u otras fuentes de deficiencia de glutatión (p.ej. alcoholismo crónico) que hayan sido tratados con paracetamol a dosis terapéuticas durante un período prolongado o una combinación de paracetamol y flucloxacilina. Si se sospecha acidosis metabólica con anión gap aumentado debida a acidosis piroglutámica, se recomienda la interrupción inmediata del paracetamol y una estrecha vigilancia. La medición de la 5-oxoprolina urinaria puede ser útil para identificar la acidosis piroglutámica como causa subyacente de acidosis metabólica con anión gap aumentado en pacientes con múltiples factores de riesgo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

Menores de 12 años.

Pacientes en los cuales la aspirina o los AINE (antiinflamatorios) les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.

Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente.

No administrar en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, enfermedad renal o alcoholismo.

Interacciones medicamentosas y otras formas de interacción

Esta asociación puede disminuir el efecto de medicamentos utilizados para tratar hipertensión y diuréticos. Puede interactuar con antibióticos,

cardiotónicos y algunos medicamentos antiparkinsonianos. El uso simultáneo con oxitocina, dihidroergotamina y ergometrina aumenta la acción vasoconstrictora. Potencia los efectos cardiovasculares de algunos antidepresivos. El uso simultáneo aumenta el efecto de las hormonas tiroideas.

Si usted está tomando algún medicamento consulte a su médico antes de utilizar **QURA GRIP**. Se debe tener precaución cuando se utilice paracetamol de forma concomitante con flucloxacilina, ya que la ingesta concomitante se ha asociado a acidosis metabólica con anión gap aumentado debida a acidosis piroglutámica, especialmente en pacientes con factores de riesgo.

Reacciones adversas

Rara vez: rash cutáneo, insomnio, mareos, trastornos gastrointestinales, taquicardia, nerviosismo, sedación, sequedad bucal.

Alteraciones de la sangre: disminución de las plaquetas.

Trastornos del metabolismo y de la nutrición: frecuencia desconocida: Acidosis metabólica con anión gap aumentado.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservar en lugar seco, a temperatura inferior de 30 °C.

Seguridad del envase: Verificar que el blíster no presente roturas.

Ante cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico.

Presentación

Envase con 10 comprimidos recubiertos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N° 56.662

Director Técnico: Gastón Landsman. Farmacéutico

Elaborado y/o acondicionado: Terrada 2346 (C1416ARZ) CABA y/o (RN85) RN8, Colectora Pilar Sur N° 3863 esq. Brasil, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de última revisión: 17/06/2025

Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346 (C1416ARZ) CABA

Teléfono: (+54 11) 4516-2222

www.laboratoriosbernabo.com

