

# AMIXEN AC

AMOXICILINA 875 mg  
ACETILCISTEÍNA 300 mg

## Comprimidos Recubiertos

### Vía oral

#### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### Contenido del prospecto

1. ¿Qué es **Amixen AC** y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **Amixen AC**?
3. ¿Cómo tomar **Amixen AC**?
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Amixen AC**
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. ¿Qué es **Amixen AC** y para qué se utiliza?

La Acetilcisteína pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos y se utiliza para fluidificar las secreciones bronquiales excesivas y/o espesas. La Amoxicilina pertenece a un grupo de medicamentos llamados antibióticos que está indicado para el tratamiento de las infecciones a gérmenes sensibles. **Amixen AC** está indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones: Infecciones del oído, nariz y garganta, infecciones del tracto respiratorio superior por cepas sensibles (solamente beta-lactamasas negativas) de los gérmenes que se mencionan a continuación: Streptococcus spp. (solo cepas alfa y beta hemolíticas), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp. o Haemophilus influenzae, especialmente cuando existan secreciones bronquiales viscosas y/o purulentas.

#### 2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **Amixen AC**?

No tome **Amixen AC**:

- Si es alérgico a la penicilina, a la acetilcisteína, a otros mucolíticos, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece infecciones por herpes virus, mononucleosis infecciosa.
- Si el paciente está tratado con allopurinol.
- Si padece úlcera gastroduodenal o úlceras esofágicas.
- Si padece insuficiencia renal severa (filtración glomerular < 30 ml/minuto).

#### Advertencias y precauciones:

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **Amixen AC**.

- Si padece asma u otros problemas respiratorios: Pueden producirse sobreinfecciones micóticas o bacterianas durante el tratamiento, si esto ocurre (Enterobacter, Pseudomonas o Cándida) debe interrumpirse el tratamiento y/o instaurarse un tratamiento adecuado.
- Se recomienda administrar con precaución a pacientes con riesgo de hemorragia gastrointestinal (Úlcera péptica latente o várices esofágicas).
- Tener en cuenta que este medicamento puede interferir con la determinación analítica de proteínas, ácido úrico y test de Coomb en sangre, y de proteínas y glucosa en orina.
- Utilice antibióticos solamente con la prescripción de un médico u odontólogo
- No se automedique ni ofrezca antibióticos a otras personas
- Cumpla el tratamiento según lo indicado, respetando la dosis, horarios de la toma y tiempo de tratamiento. No prolongue ni interrumpa tratamiento salvo que se lo indique el profesional.
- No utilice antibióticos que le hayan sobrado o que les hayan sobrado a otros.
- Lávese frecuentemente las manos con agua y con jabón.
- Mantenga su calendario de vacunación al día.

#### Toma de **Amixen AC** con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

- Si está tomando medicamentos para la tos o que reducen las secreciones bronquiales, consulte a su médico antes de tomar **Amixen AC** conjuntamente con éstos.
- No debe asociarse simultáneamente con antibióticos del grupo tetraciclina, eritromicina, sulfamidas o cloranfenicol, y en general, con antibióticos bacteriostáticos, por la posibilidad de que se produzca antagonismo, debido a su diferente mecanismo de acción.
- No debe asociarse al allopurinol por riesgo de reacciones cutáneas.
- El probenecid aumenta la vida media de la amoxicilina y, por tanto, su efecto y/o toxicidad.
- Si está tomando anticonceptivos orales consulte a su médico antes de tomar **Amixen AC** por la factibilidad que se produzca reducción de la eficacia de los mismos.

#### Toma de **Amixen AC** con alimentos y bebidas

No se han descrito interferencias si se toma **Amixen AC** con alimentos y bebidas.

### *Embarazo y lactancia*

Consulte a su médico antes de tomar **Amixen AC**. Se debe tener en cuenta el paso de la amoxicilina a través de la placenta y la leche materna, cuando se administre a mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia

### *Conducción y uso de máquinas*

No se han descrito interferencias si se está tomando **Amixen AC** sobre la conducción y/o el uso de máquinas.

### **3. ¿Cómo tomar Amixen AC?**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico. Su médico le indicará la duración de su tratamiento con **Amixen AC**. No suspenda el tratamiento antes, ya que este antibiótico solo será efectivo una vez terminado el tratamiento completo. Niños mayores de 12 años y adultos: un comprimido recubierto cada 12 horas. Las dosis pueden calcularse a razón de 35 a 100 miligramos/kilogramo/día de amoxicilina. En infecciones graves, estas dosis pueden ser aumentadas según criterio del médico tratante. No está indicado para niños menores de 12 años.

### *Si toma más Amixen AC del que debe:*

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico, concorra al Hospital más cercano o centro de Toxicología. El médico le tratará los síntomas y le proveerá las medidas de soporte que resulten necesarias. Si la sobredosis es reciente y no existen contraindicaciones, puede intentarse la inducción del vómito u otras medidas para remover la droga del estómago.

### *Si olvidó tomar Amixen AC:*

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Es preferible que consulte a su médico. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento pregunte a su médico.

### *Si interrumpe el tratamiento con Amixen AC:*

Su médico le indicará la duración del tratamiento con **Amixen AC**. No suspenda el tratamiento antes, ya que entonces no se logrará el efecto previsto.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, **Amixen AC** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Se han descrito reacciones de hipersensibilidad (Erupción eritematosa maculopapular, eritema multiforme, trastornos respiratorios). Entre las reacciones farmacológicas graves pero raras se incluyen: síndrome de Stevens-Johnson, (SJS), necrólisis epidérmica tóxica (TEN), pustulosis exantemática aguda generalizada (AGEP) y erupción por medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS). Muy excepcionalmente shock anafiláctico. Se han descrito efectos Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea, candidiasis. Raramente, elevación moderada y transitoria de las transaminasas y casos aislados de enterocolitis pseudomembranosa. Hematológicas y linfáticas: anemia, trombocitopenia, purpura trombocitopénica, eosinofilia, leucopenia y agranulocitosis, generalmente reversibles. Psiconeurológicas: Raramente, hiperactividad, agitación, ansiedad, insomnio, confusión, cambios en la conducta. Raramente, se presentan reacciones de hipersensibilidad, acompañadas de urticaria y broncospasmos, en estos casos se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al médico. Las reacciones anafilácticas graves son fenómenos de aparición poco frecuente. Cuando se presentan, debe interrumpirse el tratamiento específico en curso e instaurar inmediatamente el tratamiento dado por su médico. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

### **5. Conservación de Amixen AC**

#### **MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Conservar en lugar seco a temperatura entre 15°C y 30°C.

No utilice después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

Los principios activos de Amixen AC son Amoxicilina y Acetilcisteína.

Los demás componentes son: Crospovidona 60 mg, Talco 19,75 mg, Estearato de magnesio 19,4 mg, Alcohol polivinílico 18 mg, Laurilsulfato de sodio 15,5 mg, Dióxido de silicio coloidal 12 mg, Dióxido de titanio 11,25 mg, Polietilenglicol 9 mg, Óxido de hierro rojo 350 mg, Simeticona emulsionada 445,5 mcg, Dimeticona 350 13,8 mcg y Celulosa microcristalina c.s.p. 1610 mg.

Se presenta en comprimidos recubiertos. Envase conteniendo 14 comprimidos recubiertos.

#### **MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Todo medicamento debe ser utilizado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: 0800-333-1234.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 57.981

Director Técnico: Gastón L. Landsman, Farmacéutico

Fecha de última revisión: 20/01/2023



**LABORATORIOS BERNABÓ S.A.**  
Terrada 2346, C1416ARZ, CABA  
Tel.: (011) 4501-3278/79  
[www.laboratoriosbernabo.com](http://www.laboratoriosbernabo.com)

**Laboratorios Bernabó**

Elaboración: Asunción 2470, C1419HFH, CABA.