

BRONQ-C

CLENBUTEROL

Comprimidos - Jarabe

Composición

BRONQ-C Comprimidos

Cada comprimido contiene:

Clenbuterol clorhidrato	20 mcg
Almidón de maíz	40 mg
Povidona	20 mg
Estearato de magnesio	4 mg
Colorante amarillo ocaso	20 mcg
Lactosa c.s.p.	210 mg

BRONQ-C Jarabe

Cada 100 ml de jarabe contiene:

Clenbuterol clorhidrato	100 mcg
Sorbitol 70 %	10 g
Esencia de limón	120 mg
Sabor caramelo	110 mg
Sacarina sódica	100 mg
Acido cítrico	55 mg
Lactosa	50 mg
Metilparabeno	50 mg
Edta sódica	30 mg
Carboximetilcelulosa sódica	20 mg
Propilparabeno	20 mg
Alcohol	2 ml
Agua purificada c.s.p.	100 ml

Acción terapéutica: Broncodilatador.

Indicaciones: Tratamiento de la obstrucción reversible de la vía aérea asociada a asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Acción farmacológica: El clenbuterol es un agonista β_2 selectivo que produce broncodilatación pulmonar secundariamente a la relajación del músculo liso bronquial.

Debido a que se ha descrito cierto efecto anabólico de la droga, su utilización por deportistas no está permitida.

Farmacocinética: Clenbuterol es bien absorbido luego de su administración oral con una biodisponibilidad del 70 al 80%. El pico sérico ocurre dentro de las 3 horas. Tiene una vida media prolongada de 25 a 39 horas y la broncodilatación efectiva persiste entre 8 y 12 horas luego de su ingestión.

El 30 % de la dosis se recupera sin cambios en la orina. Su metabolismo intermedio es poco conocido. La unión a proteínas plasmáticas está entre 45 y 56%.

Posología y modo de administración:

BRONQ-C Comprimidos

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido por la mañana y por la noche. En tratamientos prolongados, la dosis diaria puede reducirse a 1/2 comprimido, dos veces por día.

En los trastornos severos, durante los primeros días de tratamiento, se recomienda administrar 2 comprimidos juntos por la mañana y por la noche; luego de instaurada la mejoría continuar con 2 comprimidos por día.

Niños de 6 a 12 años (0.5 a 1.5 mcg/kg/día): 1/2 comprimido 2-3 veces por día al comienzo del tratamiento, luego 1/2 comprimido 2 veces por día.

BRONQ-C Jarabe

La posología promedio en niños es de 1,2 mcg/kg/día repartidas en 2-3 tomas diarias:

1 medida con 5 ml de jarabe = 5 mcg de Clenbuterol, clorhidrato.

Salvo mejor criterio el esquema de dosificación recomendado es el siguiente:

Niños de 8 a 24 meses: 10 ml repartidos en 2-3 tomas diarias.

Niños de 2-4 años: 15 ml repartidos en 2-3 tomas diarias.

Niños de 4-6 años: 20 ml repartidos en 2-3 tomas diarias.

Niños de 6-12 años: 30 ml repartidos en 2-3 tomas diarias.

Niños mayores de 12 años y adultos: 2 medidas 2-3 veces por día. En tratamiento prolongado la dosis diaria puede reducirse a 2 medidas 2 veces por día.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad previa al Clenbuterol o a otros agentes adrenérgicos como albuterol, iso-proteranol, metoproteranol o terbutalina.

Advertencias: En pacientes tratados en forma conjunta con β -bloqueantes y clenbuterol se puede reducir la actividad mutuamente.

Cualquier aumento de la sintomatología o disminución del efecto terapéutico de la droga requiere la consulta con el médico para evaluar la modificación del tratamiento de base (incluir o aumentar la dosis de corticoides).

El jarabe contiene alcohol como excipiente por lo cual no debe administrarse a pacientes bajo tratamiento con disulfiram.

Precauciones: Usar con precaución en pacientes con hipertensión, arritmias cardíacas o enfermedad coronaria pues puede alterar su presión sanguínea y frecuencia cardíaca.

En pacientes con Diabetes Mellitus puede producir hiperglucemia.

Hipertiroidismo: se puede producir un aumento de los efectos adversos.

Feocromocitoma: usar bajo control médico.

Usar con precaución en pacientes con enfermedades obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca.

Interacciones medicamentosas: El uso con inhibidores de la MAO puede producir hipertensión.

Interacción e influencia sobre pruebas de laboratorio: No se han descripto.

Carcinogénesis - Mutagénesis - Trastornos de la fertilidad: No se han descripto.

Embarazo - Efectos teratogénicos: Aunque las experiencias realizadas en animales no han revelado efectos teratogénicos, se recomienda no administrar BRONQ-C durante el embarazo y la lactancia.

Reacciones adversas:

Cardiovasculares: El más frecuente es el aumento de la frecuencia cardíaca y cambios en la presión sanguínea, palpitaciones, rara vez alteraciones del E.C.G.

Sistema nervioso central: Frecuentemente cefaleas, mareos, temblor, ocasionalmente disquinesias (más frecuente en ancianos). Hiperactividad.

Endócrinos: ocasionalmente hiperglucemia.

Gastrointestinales: ocasionalmente náuseas. Rara vez dolor epigástrico y sequedad bucal.

Piel: Rara vez dermatitis de contacto.

Sobredosificación: Los síntomas de sobredosificación son taquicardia, temblor, cefalea, nerviosismo y mialgias. Clenbuterol es antagonizado por los betabloqueantes.

Orientativamente se puede provocar el vómito y utilizar carbón activado.

"Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962 - 6666 / 2247 Hospital A. Posadas: (011) 4654 - 6648 / 658 - 7777"

***Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar a temperatura entre 15°C y 30°C***

Presentaciones: BRONQ-C Comprimidos: Envase con 30 comprimidos

BRONQ-C Jarabe: Envase con 100 ml.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 35.804

Elaboración Jarabe: Cnel. Méndez 440, (B1875DQJ), Wilde, Pcia. de Buenos Aires

Dirección Técnica: Gastón L. Landsman. Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 30/11/01



Laboratorios Bernabó

Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Tel.: (011) 4501-3278/79

www.laboratoriosbernabo.com