

TERBENOL DÚO 1000

DIOSMINA 900 mg - HESPERIDINA 100 mg

Fracción flavonoide purificada micronizada

SC29/65

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto, puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda o no está seguro, consulte a su médico o a su farmacéutico.
- Este medicamento se lo han recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas, puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

Contenido del prospecto:

- 1 . ¿Qué es y para qué se utiliza **TERBENOL DÚO 1000**?
- 2 . Antes de usar **TERBENOL DÚO 1000**
- 3 . ¿Cómo utilizar **TERBENOL DÚO 1000**?
- 4 . Posibles eventos adversos
- 5 . Conservación del envase
- 6 . Información adicional

1 . ¿Qué es y para qué se utiliza **TERBENOL DÚO 1000**?

TERBENOL DÚO 1000 es un medicamento venotónico: aumenta el tono de las venas y la resistencia de los capilares (pequeños vasos sanguíneos).

TERBENOL DÚO 1000 se utiliza para el alivio a corto plazo (durante dos o tres meses) del edema y de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica y crisis hemorroidal.

2 . Antes de usar **TERBENOL DÚO 1000**

No tome **TERBENOL DÚO 1000**

Si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar **TERBENOL DÚO 1000**.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en período de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. No se tiene constancia de ningún efecto nocivo en la especie humana. Se debe extremar la precaución en el uso de **TERBENOL DÚO 1000** durante el embarazo, valorando adecuadamente el posible beneficio de este medicamento durante el mismo. No se tiene constancia de si el medicamento pasa a la leche materna por lo que se desaconseja su uso durante la lactancia.

Conducción y manejo de máquinas:

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducción y uso de máquinas con **TERBENOL DÚO 1000**.

Toma de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos, en todo caso nunca debe tomar otro medicamento por iniciativa propia sin que se lo haya recetado su médico.

3 . ¿Cómo utilizar TERBENOL DÚO 1000?

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento por vía oral.

La dosis terapéutica usual en la insuficiencia venosa es de 1 comprimido recubierto al día.

En la crisis hemorroidal la dosis es de 3 comprimidos diarios durante los primeros 4 días, luego 2 comprimidos diarios los 3 días siguientes.

En el mantenimiento de la enfermedad hemorroidal 1 comprimido recubierto por día.

Si usted toma más comprimidos de TERBENOL DÚO 1000 de los que debiera:

No se han descrito casos de sobredosificación con flavonoides micronizados.

Si olvidó tomar TERBENOL DÚO 1000:

Es importante tomar este medicamento cada día. Sin embargo, si olvidó tomar una o más dosis de **TERBENOL DÚO 1000**, tome otro comprimido tan pronto como se acuerde y después siga con el tratamiento prescripto. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4 . Posibles eventos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **TERBENOL DÚO 1000** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Frecuentes: Trastornos gastrointestinales leves: náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia.

Raros: Trastornos neurovegetativos: dolor de cabeza, malestar, vértigo. Trastornos cutáneos: erupción, prurito, urticaria.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto informe a su médico.

5 . Conservación de TERBENOL DÚO 1000

Conservar en su envase original, en lugar seco a una temperatura entre 15°C y 30°C. No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ 4658-7777.

6 . Información adicional:

Composición de TERBENOL DÚO 1000

El principio activo es: Fracción de flavonoides purificados y micronizados 1000 mg conteniendo: Diosmina 900 mg, Hesperidina 100 mg. Excipientes: Crospovidona 85 mg, Povidona K 30 40 mg, Lauril sulfato de sodio 13 mg, Estearato de magnesio 6 mg, Celulosa microcristalina tipo 101 156 mg, Alcohol polivinílico* 15,360 mg, Dióxido de titanio* 9,600 mg, Polietilenglicol* 7,680 mg, Talco* 5,760 mg, Antifoam 0,384 mg, Laca lumínica amarillo ocaso 1,210 mg.

* Cobertura blanca PVA.

Presentación:

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 49.592

Director Técnico: Gastón L. Landsman, Farmacéutico.

Fecha de última Revisión: 26/10/2022



Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346, C1416 ARZ, CABA., Teléfonos: (011) 4501-3278/779, www.laboratoriosbernabo.com

Elaborado y/o acondicionado en: Terrada 2346, CABA y/o Colectora Ruta Panamericana Ramal Pilar Km. 36

N° 3863, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.