

# ROSUBER PLUS

## ROSUVASTATINA / EZETIMIBE 10 mg / 10 mg

## ROSUVASTATINA / EZETIMIBE 20 mg / 10 mg

### Comprimidos recubiertos

#### Información para el paciente:

- Sírvase leer esta información antes de comenzar a tomar el medicamento, aún cuando simplemente haya repetido la receta (o antes de empezar a usarlo y cada vez que renueve su receta). Puede haber información nueva (o alguna información puede haber cambiado).
- Recuerde que su médico le recetó este medicamento sólo a usted. No lo administre (o recomiende) a ninguna otra persona.
- Esta información no reemplaza el hablar con su médico acerca de su enfermedad o el tratamiento.
- Este medicamento debe ser indicado por su médico y prescripto bajo una receta médica, u otra condición de venta, según corresponda.

#### COMPOSICIÓN:

Cada comprimido recubierto de **ROSUBER PLUS 10 mg /10 mg** contiene:

Rosuvastatina (como Rosuvastatina Cálcica 10,4 mg) 10 mg; Ezetimibe 10 mg; Fosfato bicalcico anhidro 45 mg; Almidón pregelatinizado 30 mg; Croscarmelosa sódica 15 mg; Crospovidona 10 mg; Povidona 9 mg; Estearilumarato de sodio 8 mg; Laurilsulfato de sodio 6 mg; Meglumina 5 mg; Dióxido de silicio coloidal 1,50 mg; Butilhidroxianisol 150 mcg; Óxido de hierro rojo (Cl 77491) 142,48 mcg; Celulosa 87,465 mg; Lactosa Monohidratada 262,395 mg; Alcohol polivinílico 5,914 mg; Dióxido de titanio 3,696 mg; Polietilenglicol 2,957 mg; Talco 2,218 mg; Simeticona emulsionada 147,85 mcg; Óxido de hierro amarillo (Cl 77492) 14,78 mcg.

Cada comprimido recubierto de **ROSUBER PLUS 20 mg /10 mg** contiene: Rosuvastatina (como Rosuvastatina Cálcica 20,8 mg) 20 mg; Ezetimibe 10 mg; Fosfato bicalcico anhidro 90 mg; Almidón pregelatinizado 60 mg; Crospovidona 20 mg; Croscarmelosa sódica 15 mg; Estearilumarato de sodio 12 mg; Meglumina 10 mg; Povidona 9 mg; Laurilsulfato de sodio 6 mg; Dióxido de silicio coloidal 1,50 mg; Butilhidroxianisol 150 mcg; Óxido de hierro rojo (Cl 77491) 163,47 mcg; Celulosa 110,99 mg; Lactosa Monohidratada 332,97 mg; Alcohol polivinílico 8,28 mg; Dióxido de titanio 5,17 mg; Polietilenglicol 4,14 mg; Talco 3,105 mg; Simeticona emulsionada 207 mcg; Óxido de hierro amarillo (Cl 77492) 20,69 mcg.

#### 1) ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre este producto?

- Debe Informar a su médico inmediatamente si durante el tratamiento con este medicamento tiene dolores o calambres musculares injustificados, especialmente si presenta malestar general o fiebre. Informe también a su médico si presenta debilidad muscular constante.
- No tome este medicamento si está tomando ciclosporina (medicamento utilizado tras un trasplante de órgano para evitar el rechazo del órgano transplantado).
- No debe tomar este medicamento si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada. Si queda embarazada mientras está tomando este medicamento, deje de tomarlo inmediatamente e informe a su médico.
- Las mujeres deben utilizar métodos anticonceptivos durante el tratamiento con este medicamento.
- No debe tomar este medicamento si está dándole el pecho a su bebé, ya que se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna.
- No debe tomar este medicamento si sufre de enfermedad hepática activa.
- Este medicamento debe usarse con precaución en pacientes que ingieran cantidades excesivas de alcohol.
- Debe consultar a su médico antes de tomar este medicamento si está en tratamiento con ácido fúlsico ya que la toma de ambos medicamentos puede producir problemas musculares graves (rabdomicólisis).
- Debe suspender inmediatamente la toma de este medicamento si durante el tratamiento sufre reacciones alérgicas como hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, las cuales pueden causar dificultad en la respiración y para tragar, síndrome de enfermedad similar al lupus (que incluye erupción cutánea, trastornos de las articulaciones y efectos en las células sanguíneas) y rotura muscular.
- Debe suspender inmediatamente la toma de este medicamento si durante el tratamiento tiene úlceras o ampollas en la piel, boca, ojos y genitales. Estos podrían ser signos del síndrome de Stevens-Johnson (una reacción alérgica potencialmente mortal que afecta a la piel y a las membranas mucosas).

#### 2) ¿Qué es y para qué se utiliza este producto?

**ROSUBER PLUS** contiene dos principios activos diferentes en un comprimido recubierto. Uno de los principios activos es rosuvastatina, que pertenece al grupo de medicamentos denominados estatinas, el otro principio activo es ezetimibe. **ROSUBER PLUS** es un medicamento que se utiliza en pacientes adultos para reducir los niveles elevados de colesterol, el colesterol "malo" (colesterol LDL) y unas sustancias grasas llamadas triglicéridos que circulan en la sangre. Además, este medicamento eleva las concentraciones del colesterol "bueno" (colesterol HDL). Este medicamento actúa reduciendo el colesterol de dos maneras: reduce el colesterol que se absorbe en el tubo digestivo, así como el colesterol producido por el propio organismo. Para la mayoría de las personas, los niveles elevados de colesterol no afectan a cómo se sienten ya que no producen ningún síntoma. No obstante, si no se trata, los depósitos grasos pueden acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos y estrecharlos. Algunas veces, estos vasos sanguíneos estrechados pueden bloquearse cortando así el suministro de sangre al corazón o el cerebro, lo que provocaría un ataque al corazón o un infarto cerebral. Al reducir los niveles de colesterol, se puede reducir su riesgo de tener un ataque al corazón, un infarto cerebral u otros problemas de salud relacionados. Este medicamento se usa en pacientes que no pueden controlar sus niveles de colesterol únicamente con la dieta. Mientras toma este medicamento debe seguir una dieta reductora del colesterol. Su médico puede recetarle **ROSUBER PLUS** si ya está tomando rosuvastatina y ezetimibe al mismo nivel de dosis. Este medicamento no le ayuda a perder peso.

#### 3) ¿Qué es lo que debo saber antes de tomar ROSUBER PLUS y durante el tratamiento?

##### ¿Quiénes no deben tomar ROSUBER PLUS?

- si es alérgico a la rosuvastatina, al ezetimibe o a alguno de los demás componentes de la fórmula de este medicamento. - si tiene enfermedad hepática.
- si tiene problemas renales graves. - si tiene dolores y calambres musculares repetidos o injustificados (miotopatía). - si está tomando un medicamento llamado ciclosporina (utilizado, por ejemplo, tras un trasplante de órgano). **No tome ROSUBER PLUS si está tomando ciclosporina.**
- si está embarazada o en periodo de lactancia. Si queda embarazada mientras está tomando **ROSUBER PLUS**, deje de tomarlo inmediatamente e informe a su médico. **Las mujeres deben evitar quedar embarazadas durante el tratamiento con este medicamento empleando un método anticonceptivo apropiado. Si se encuentra en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas (o no está seguro), consulte a su médico.**

##### ¿Qué debo informar a mi médico antes de tomar ROSUBER PLUS?

Antes de tomar **ROSUBER PLUS**, dígame a su médico:

- si usted tiene problemas renales. - si usted tiene problemas hepáticos. - si usted tiene dolores y calambres musculares repetidos o injustificados, un historial personal o familiar de problemas musculares o un historial previo de problemas musculares durante el tratamiento con otros medicamentos para disminuir los niveles de colesterol. Informe a su médico inmediatamente si tiene dolores o calambres musculares injustificados, especialmente si presenta malestar general o fiebre. Informe también a su médico o farmacéutico si presenta debilidad muscular constante.
- si usted es de origen asiático (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio). Su médico debe establecer la dosis adecuada para usted.
- si usted toma medicamentos para tratar infecciones, incluyendo VIH (virus del SIDA) o hepatitis C, como por ejemplo lopinavir/ritonavir y/o atazanavir o simeprevir.
- si usted tiene insuficiencia respiratoria grave. - si usted toma otros medicamentos llamados fibratos para disminuir el colesterol. - si usted ingiere regularmente grandes cantidades de alcohol. - si su glándula tiroidea no funciona correctamente (hipotiroidismo). - si usted es mayor de 70 años, (ya que su médico debe elegir la dosis adecuada de **ROSUBER PLUS** para usted). - si usted está tomando o ha tomado en los últimos 7 días un medicamento llamado ácido fúlsico (un medicamento para la infección bacteriana) por vía oral o inyectable. La combinación de ácido fúlsico y **ROSUBER PLUS** puede producir problemas musculares graves (rabdomicólisis). **Si se encuentra en alguna de estas situaciones mencionadas anteriormente (o no está seguro): consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar cualquier dosis de este medicamento.** En un número reducido de personas, las estatinas pueden afectar al hígado. Esto se detecta mediante una sencilla prueba que detecta niveles aumentados de enzimas hepáticas en la sangre. Por esta razón, su médico normalmente le realizará análisis de sangre (prueba de la función hepática) durante el tratamiento con este medicamento. Es importante que vaya al médico para realizarse los análisis.
- Mientras está tomando este medicamento su médico le vigilará estrechamente si padece diabetes o tiene riesgo de presentar diabetes. Probablemente, tendrá riesgo de desarrollar diabetes si presenta niveles altos de azúcar y grasas en sangre, tiene sobrepeso y tiene la presión arterial elevada. **Niños y adolescentes:** No se recomienda el uso de este medicamento en niños y adolescentes menores de 18 años de edad. **Embarazo y lactancia:** No tome **ROSUBER PLUS** si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada. Si queda embarazada mientras está tomando este medicamento, deje de tomarlo inmediatamente e informe a su médico. **Las mujeres deben utilizar métodos anticonceptivos durante el tratamiento con este medicamento.** No tome **ROSUBER PLUS** si está en periodo de lactancia, ya que se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna. **Conducción y uso de máquinas:** No se espera que este medicamento interfiera con su capacidad para conducir o usar maquinaria. Sin embargo, algunas personas pueden sentir mareos después de tomar este medicamento. Si se encuentra mareado, no conduzca ni use maquinaria.

#### ¿Puedo tomar ROSUBER PLUS con otros medicamentos?

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma. Ello incluye: Medicamentos bajo receta, Medicamentos de venta libre, Suplementos a base de hierbas. Informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: - Ciclosporina (empleado por ejemplo tras un trasplante de órgano para evitar el rechazo del órgano trasplantado). El efecto de la rosuvastatina aumenta con su uso conjunto). **No tome ROSUBER PLUS si está tomando ciclosporina.** - Anticoagulantes, como p. ej., warfarina, acenocumarol o fluidinona (sus efectos anticoagulantes y el riesgo de hemorragia pueden aumentar mientras se toma junto con este medicamento), o clopidogrel. - Otros medicamentos para disminuir el colesterol llamados fibratos, que también corrigen los niveles de triglicéridos en sangre (p. ej., gemfibrozil y otros fibratos). El efecto de la rosuvastatina aumenta cuando se usa gemfibrozil junto a este medicamento. - Colestiramina (un medicamento para bajar el colesterol), porque afecta a la forma en la que el ezetimibe funciona. - Cualquiera de los siguientes medicamentos utilizados para tratar las infecciones virales, incluyendo infecciones por VIH o hepatitis C, solo o en combinación: ritonavir, lopinavir, atazanavir, simprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glecaprevir, pibrentasvir. - Tratamientos para la indigestión que contienen aluminio y magnesio (utilizados para neutralizar el ácido del estómago, ya que reducen el nivel de rosuvastatina en plasma). Este efecto se puede mitigar tomando este tipo de medicamentos 2 horas después de ROSUBER PLUS. - Eritromicina (un antibiótico). El efecto de la rosuvastatina disminuye con su uso conjunto. - Ácido fusídico. Si tiene que tomar ácido fusídico oral para tratar una infección bacteriana, deberá interrumpir temporalmente la toma de este medicamento. Su médico le indicará cuándo puede volver a tomar de forma segura ROSUBER PLUS. La toma de este medicamento junto con ácido fusídico puede ocasionar raramente debilidad, dolor o sensibilidad musculares (rabdomiólisis). - Anticonceptivo oral. Los niveles de hormonas sexuales que se absorben del anticonceptivo están aumentados. - Terapia de reemplazo hormonal (aumento de los niveles de hormonas en la sangre). - Regorafenib (indicado para tratar el cáncer). Si acude a un hospital o recibe tratamiento para otra enfermedad, dígame al personal médico que está tomando ROSUBER PLUS.

#### 4) ¿Cómo debo tomar ROSUBER PLUS?

La vía de administración de este medicamento es VIA ORAL. Tome ROSUBER PLUS exactamente como se lo indicó el médico, a las horas del día que correspondan respetando la dosis y duración. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico. Este medicamento no es adecuado para iniciar un tratamiento. El inicio del tratamiento o los ajustes de las dosis, en caso necesario, solo deben realizarse tomando los principios activos por separado, y una vez ajustadas las dosis adecuadas ya es posible cambiar a la dosis apropiada de ROSUBER PLUS. Debe seguir una dieta baja en colesterol y hacer ejercicio mientras toma ROSUBER PLUS. La dosis diaria recomendada para adultos es un comprimido recubierto. **Tome ROSUBER PLUS una vez al día.** Puede tomarlo a cualquier hora del día, independientemente de las comidas. Tome el medicamento todos los días a la misma hora. Debe tomar los comprimidos recubiertos enteros, con un vaso de agua.

**Controles regulares de los niveles de colesterol:** Es importante que acuda a su médico regularmente para realizarse controles del colesterol, con objeto de comprobar que sus niveles de colesterol se han normalizado y se mantienen en niveles apropiados.

#### ¿Qué debo hacer en caso de sobredosis?

Si toma más de la dosis recetada de ROSUBER PLUS, consulte a su médico o al centro de intoxicaciones ya que puede necesitar asistencia médica.

**Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666 / 2247. Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.**

**Centro de Asistencia Toxicológica La Plata- Tel.: (0221) 451-5555.**

#### ¿Qué debo hacer si dejo de tomar una dosis?

Si olvidó tomar una dosis, omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis programada a la hora prevista. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene dudas consulte a su médico.

#### Si interrumpe el tratamiento con ROSUBER PLUS

Consulte a su médico si quiere interrumpir el tratamiento con este medicamento. Sus niveles de colesterol pueden aumentar otra vez si deja de tomar este medicamento.

#### 5) ¿Cuáles son los efectos adversos que puede tener ROSUBER PLUS?

Al igual que todos los medicamentos, ROSUBER PLUS puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

**Deje de tomar ROSUBER PLUS y busque asistencia médica inmediatamente si presenta alguno de los siguientes efectos adversos:**

**Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):**

- Reacciones alérgicas como hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, las cuales pueden causar dificultad en la respiración y para tragar, síndrome de enfermedad similar al lupus (que incluye erupción cutánea, trastornos de las articulaciones y efectos en las células sanguíneas) y rotura muscular.

- Dolores y calambres musculares injustificados que duran más de lo esperado. En raras ocasiones, esto puede convertirse en un daño muscular potencialmente mortal conocido como rabdomiólisis, lo que conduce a malestar general, fiebre e insuficiencia renal. *Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)*. - Ulceras o ampollas en la piel, boca, ojos y genitales. Estos podrían ser signos del síndrome de Stevens-Johnson (una reacción alérgica potencialmente mortal que afecta a la piel y a las membranas mucosas).

**Otros efectos adversos:**

**Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)** - Dolor de cabeza. - Estreñimiento. - Malestar general. - Dolor muscular. - Debilidad. - Mareo. - Diabetes. Esto es más probable si tiene altos los niveles de azúcar y lípidos en sangre, sobrepeso y su tensión arterial elevada. Su médico le controlará mientras esté tomando este medicamento. - Dolor de estómago. - Diarrea - Flatulencia (exceso de gas en el tracto intestinal). - Sentirse cansado. - Niveles altos en algunos resultados de análisis de sangre de la función hepática (transaminasas).

**Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)** - Erupción cutánea, picor, urticaria. - Niveles altos en algunos resultados de análisis de sangre de la función muscular (Test de la Creatina Kinasa). - Tos. - Indigestión. - Ardor de estómago. - Dolor en las articulaciones. - Espasmos musculares.

- Dolor en el cuello. - Disminución del apetito. - Dolor - Dolor en el pecho. - Sofocos. - Tensión arterial alta. - Sensación de hormigueo. - Sequedad de boca. - Inflamación de estómago. - Dolor de espalda. - Debilidad muscular. - Dolor en los brazos y en las piernas. - Hinchazón, especialmente de las manos y los pies.

**Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)** - Inflamación del páncreas, que provoca un dolor intenso de estómago que puede extenderse a la espalda; - Reducción de los niveles de plaquetas sanguíneas.

**Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)** - Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos). - Inflamación del hígado (hepatitis). - Trazas de sangre en la orina. - Lesión de los nervios de las piernas y brazos (como entumecimiento). - Pérdida de memoria. - Aumento del tamaño de las mamas en hombres (ginecomastia).

**Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)** - Dificultad para respirar. - Edema (hinchazón). - Alteraciones del sueño, incluyendo insomnio y pesadillas. - Distorsión sexual. - Depresión. - Problemas respiratorios incluyendo tos persistente y/o dificultad para respirar o fiebre. - Lesiones en los tendones. - Debilidad muscular constante. - Calambres o inflamación de la vesícula biliar (que puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos).

**Tome contacto con su médico de inmediato si desarrolla cualquier efecto adverso incluso si no figura en el listado anterior.**

#### 6) ¿Cómo debo conservar ROSUBER PLUS?

Ud. puede tomar ROSUBER PLUS hasta el último día del mes indicado en el envase (caja y blíster). No tome ROSUBER PLUS luego de la fecha de vencimiento.

**Conservar en su envase original, en lugar seco a una temperatura entre 15°C y 30°C.**

#### 7) Información adicional

Este medicamento contiene lactosa. Aquellos pacientes con condiciones hereditarias de intolerancia a la galactosa, insuficiencia de lactasa o absorción insuficiente de glucosa, galactosa deben consultar al médico antes de consumir este producto.

#### Presentación:

ROSUBER PLUS 10 mg /10 mg: Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

ROSUBER PLUS 20 mg /10 mg: Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Este folleto resume la información más importante de ROSUBER PLUS, para mayor información y ante cualquier duda CONSULTE CON SU MÉDICO.

**"Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños". No use este medicamento si la etiqueta o el envase está dañado.**

**Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT:**

**<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: 0800-333-1234.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 59.316.

Director Técnico: Gastón L. Landsman, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 22/10/2020



Laboratorios Bernabó

Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Teléfono: (011) 4501-3278/79, [www.laboratoriosbernabo.com](http://www.laboratoriosbernabo.com)

Elaborado y/o acondicionado en: Terrada 2346, CABA y/o Colectora Ruta Panamericana Ramal Pilar km 36 N° 3863, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires y/o Santa Rosa N° 3676, Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.



SS55/65