

NUEVO

dexogastec

DEXLANSOPRAZOL

Una **nueva generación de IBP**
con **24 horas de control**



30 mg | 60 mg

Cápsulas con microgránulos de liberación prolongada.

Expertos en cuidado digestivo



Gastro
Bernabó

NUEVO

dexogastec

DEXLANSOPRAZOL 30 / 60 mg

Una **nueva generación de IBP**
con **24 horas de control**

Prevalencia de la ERGE en Argentina

1 de cada 4 personas presentan **síntomas típicos de reflujo** (pirosis, regurgitación) una vez por semana. Es decir, el **23%** de la población Argentina.



1 de cada 3 pacientes con **ERGE** no responden a los IBP tradicionales.



Causas de Reflujo Refractario

ERGE con regurgitación

Pacientes con IMC > 30

Comorbilidades

Pacientes con metabolización rápida de los IBP (genotipos CYP2C19)

Sexo femenino

Indicaciones de Dexogastec: Posología y Forma de Administración


DEXOGASTEC está indicado en adultos y adolescentes a partir de los 12 años de edad.

Indicación	Administración de DEXOGASTEC Cápsulas	Duración del Tratamiento
Tratamiento de la Esofagitis Erosiva (EE)	1 cápsula diaria de 60 mg	Hasta 8 semanas
Tratamiento de mantenimiento de la Esofagitis Erosiva (EE) y alivio de la acidez gástrica	1 cápsula diaria de 30 mg	Los estudios controlados no se extendieron más de 6 meses en adultos y 16 semanas en pacientes de 12 a 17 años de edad
ERGE no erosiva sintomática	1 cápsula diaria de 30 mg	4 semanas

Recomendaciones: DEXOGASTEC puede tomarse fuera de las comidas. La cápsula de DEXOGASTEC debe ingerirse entera. Opcionalmente pueden abrirse las cápsulas, esparcir su contenido en una cucharada de puré de manzana y deglutir de inmediato. No deben masticarse los gránulos.

Dexogastec: El IBP de Elección para el Reflujo Refractario

Único IBP de liberación prolongada que otorga un perfil farmacocinético con dos picos de concentración plasmática diferente: el primero ocurre entre 1 a 2 horas luego de su administración (microgránulos blancos) y el segundo pico dentro de las 4 a 5 horas posteriores (microgránulos verdes).



Ventajas de Dexogastec



Es el IBP indicado en el reflujo nocturno y regurgitación.



Cura la Esofagitis Erosiva en más del 90%.



Mejor respuesta terapéutica en pacientes con ERGE con IMC > de 30.



Mejora la calidad de vida y el sueño en el reflujo nocturno.



Una dosis diaria de mantenimiento reduce la pirosis en un 88%.



Logra su mayor respuesta terapéutica a los 5 días de iniciado el tratamiento.



Mayor Protección

24 horas de alivio de la acidez estomacal por ERGE.



Flexibilidad

En cualquier momento del día con o sin alimentos.



Comodidad Posológica

1 toma al día, todos los días.

NUEVO

dexogastec

DEXLANSOPRAZOL

Una nueva generación de IBP
con 24 horas de control



IBP de elección
para el reflujo
refractario



Cápsulas con
microgránulos
de liberación
prolongada



1 toma diaria
con o sin
alimentos



Eficacia y
seguridad en el
control del pH
gástrico



Presentaciones

Dexogastec 30 mg
Dexlansoprazol 30 mg
x 30 cápsulas con microgránulos
de liberación prolongada

Dexogastec 60 mg
Dexlansoprazol 60 mg
x 30 cápsulas con microgránulos
de liberación prolongada

Para mayor información comunicarse al (011) 4501-3213/18
o escribanos a departamentomedico@laboratoriosbernabo.com
Laboratorios Bernabó S.A. Terrada 2346 (C1416ARZ) C.A.B.A.

  **laboratoriosbernabo**
www.laboratoriosbernabo.com



Laboratorios Bernabó